

Plantes invasives en France

Compilation mise à jour, le 12 juin 2015, par Benjamin LISAN
















Les raisons de ce document sont indiquées à la fin de ce dernier.









Actuellement, cette liste regroupe plus de 140 plantes invasives en France.









Mais si une plante invasive en France ne serait pas présente dans ce tableau, n'hésitez pas à me le signaler en m'écrivant à cette adresse email : benjamin.lisan (at) free.fr




Merci par avance, pour votre contribution à l'amélioration de ce tableau.










Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Abutilon d'Avicenne, abutilon de Théophraste, abutilon à fleurs jaunes 	<i>Abutilon theophrasti</i> 	Malvaceae	Elle a un caractère invasif, depuis quelques années, dans les exploitations industrielles de maïs irrigué, dans les milieux où les pratiques de culture, mal conduites, sont destructrices des sols. Son envahissement est toujours provoqué par l'homme. Elle a démontré une action allélopathique négative sur les cultures de soja , radis , et maïs notamment.
	Agave americana	<i>Agave americana</i>	Agavacées	Il forme des peuplements denses voire impénétrables diminuant de la diversité d'espèces indigènes dans les sites envahis. Climat chaud. Sa sève peut provoquer des dermatoses par la présence de saponines , d'huiles irritantes et de cristaux d' oxalate de calcium .
	Ail à trois angles	<i>Allium triquetrum</i>	Liliaceae	Espèce à surveiller Commercialisée. Plante comestible : bulbe, feuilles et fleurs se mangent crus en pesto, salade, ou cuits.
	Ailanthé glanduleux, vernis ou faux-vernis du Japon, Frêne puant	<i>Ailanthus altissima</i>	Simaroubaceae	Espèce exotique envahissante avérée, commercialisée.













Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Alysson blanc	<i>Berteroa incana</i>	Brassicaceae	Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. ☠
	Amarante hybride ou verte	<i>Amaranthus hybridus</i>	Amaranthaceae	Espèce à surveiller introduite. Comestible.
	Ambroisie annuelle, Ambroisie à feuilles d'armoise	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Asteraceae	Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. ☠
	Amorphe buissonnante ou faux-indigo 	<i>Amorpha fruticosa</i>	Fabaceae	Elle tend à devenir dominante et à former des peuplements monospécifiques, dans les forêts alluviales sous influence anthropique, d'où la disparition des communautés végétales alluviales indigènes, particulièrement en conditions eutrophes. Ses gousses contiennent une substance appelée « amorphine » toxique pour un grand nombre d'insectes. L'espèce a tendance à devenir envahissant en Europe centrale et méditerranéenne.
	Arbre aux papillons, Lilas de Chine, Buddlejia du Père David	<i>Buddleja davidii</i>	Buddlejaceae	Espèce exotique envahissante potentielle commercialisée
	Armoise des frères Verlot, Armoise de Chine	<i>Artemisia verlotiorum</i>	Asteraceae	Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement












Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	<p>Asclépiade de Syrie</p> 	<p><i>Asclepias syriaca</i></p>	<p>Asclépiadacées</p>	<p>C'est une plante toxique. ⚠ Elle peut former des populations denses, qui évincent localement la végétation indigène. Les feuilles larges portent un ombrage important au sol, empêchant l'installation d'autres espèces. Elle est favorisée par la déforestation.</p>
	<p>Aster à feuilles de saule</p>	<p><i>Aster x salignus</i></p>	<p>Asteraceae</p>	<p>Espèce à surveiller introduite</p>
	<p>Aster de Nouvelle-Belgique, Aster de Virginie</p>	<p><i>Aster novi-belgii</i></p>	<p>Asteraceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée</p>
	<p>Aster écailléux</p>	<p><i>Aster squamatus</i></p>	<p>Asteraceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement</p>
	<p>Aster lancéolé, aster de la Nouvelle-Belgique</p>	<p><i>Aster lanceolatus</i> <i>Aster novi-belgii</i> aggr. (<i>A. lanceolatus</i>, <i>A. novi-belgii</i>, <i>A. x salignus</i>, <i>A. tradescantii</i>, <i>A. x versicolor</i>)</p>	<p>Asteraceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante avérée introduite</p>
	<p>Azolle fausse-fougère</p> 	<p><i>Azolla filiculoides.</i></p>	<p>Azollaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante avérée commercialisée (aquatique). Engrais vert. Bio-épuration et bio-remédiation.</p>









Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Balsamine à petites fleurs	<i>Impatiens parviflora</i>	Balsaminaceae	Espèce à surveiller introduite
	Balsamine de Balfour	<i>Impatiens balfouri</i>	Balsaminaceae	Espèces exotique envahissante potentielle commercialisée
	Balsamine du Cap	<i>Impatiens capensis</i>	Balsaminaceae	Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement
	Balsamine géante, Grande balsamine	<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsaminaceae	Espèce à surveiller Commercialisée
	Bassie à balais 	<i>Bassia scoparia</i>	Chenopodiaceae	Il s'agit d'une espèce rudérale, qui colonise des surfaces ouvertes et qui, comme de nombreuses mauvaises herbes, peut former des peuplements denses et quasi mono-spécifiques. L'espèce a la capacité d'évincer d'autres espèces. Utilisée comme fourrage dans les environnements secs, ou encore pour le contrôle de l'érosion. Elle est aussi utilisée pour la phytoextraction . Usages médicaux. Elle est toxique lorsqu'elle est consommée en grande quantité par le bétail et rend sa viande toxique (elle provoque perte de poids ou de la photosensibilité ; de l' hyperbilirubinémie ou de la polyurie).
	Berce du Caucase, Berce géante 	<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Apiaceae	Espèce à surveiller Commercialisée











Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Bidens à feuilles connées	<i>Bidens connata</i>	Asteraceae	Espèce à surveiller introduite
	Bidens à fruits noirs	<i>Bidens frondosa</i>	Asteraceae	Espèce exotique envahissante avérée introduite. Plantation interdite en Belgique. Invasive en Corse.
	Brome purgatif	<i>Bromus willdenowii</i>	Poaceae	Espèce à surveiller Commercialisée
	Bunias d'orient	<i>Bunias orientalis</i> L.	Brassicaceae	Espèce à surveiller introduite
	Cabomba de Caroline	<i>Cabomba caroliniana</i>	Cabombaceae	Espèces exotique envahissante potentielle commercialisée (aquatique)
	Camomille maritime 	<i>Anthemis maritima</i>	Asteraceae	Espèces exotique envahissante potentielle commercialisée






Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Canne de Provence	<i>Arundo donax</i> L.	Poaceae	Espèce à surveiller Commercialisée
 	Caulerpe ou « algue tueuse »	<i>Caulerpa taxifolia</i>	Ulvophyceae	Algue verte pérenne de type nématothalle d'origine tropicale appartenant aux Ulvophyceae à structure siphonnée . Elle est connue sous le nom d'« algue tueuse », en raison de sa toxicité pour la faune, de son impact négatif sur la biodiversité et de sa vitesse de développement inquiétante . Milieu marin (eau ~chaude).
	 Cerisier tardif cerisier d'automne ou	<i>Prunus serotina</i>	Rosaceae	Espèce à surveiller Commercialisée. Fruits comestibles.
	Chénopode fausse-ambrosie, épazote 	<i>Chenopodium ambrosioides</i> <i>Dysphania ambrosioides</i>	Chenopodiaceae	Espèce à surveiller introduite
	Chèvrefeuille de Henry 	<i>Lonicera henryi</i>	Caprifoliaceae	Les tiges sont enchevêtrées et forment des populations denses empêchant l'apparition d'espèces de sous-bois et le rajeunissement de la forêt. Baies noir bleuâtre, pruneuses, toxiques pour les humains. ☠










Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Chèvrefeuille du Japon 	<i>Lonicera japonica</i>	Caprifoliaceae	Espèce à surveiller commercialisée. Usages médicinaux.
	Cinénaire maritime, Sénéçon cinéraire	<i>Senecio cineraria</i>	Asteraceae	Espèce à surveiller Commercialisée
	Claytonie perfoliée ou pourpier d'hiver	<i>Claytonia perfoliata</i>	Portulacaceae	Espèces exotique envahissante potentielles commercialisée. Comestible : utilisée comme un légume-feuille . Elle se consomme crue en salade ou cuite comme des épinards.
	Colza 	<i>Brassica napus</i>	Brassicaceae	Espèces exotique envahissante potentielle commercialisée. Huile comestible.
	Concombre sauvage, concombre piquant  	<i>Echinocystis lobata</i> 	Cucurbitaceae	Plante grimpante annuelle. Elle peut être considérée comme un envahisseur émergent en Europe.
	Consoude bulbeuse, Consoude à bulbe 	<i>Symphytum bulbosum</i>	Boraginaceae	Espèce à surveiller commercialisée









Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	<p>Corne-de-cerf didyme</p> 	<p><i>Coronopus didymus</i></p>	<p>Brassicaceae</p>	<p>Espèce à surveiller introduite</p>
	<p>Cornouiller soyeux</p> 	<p><i>Cornus sericea</i></p> 	<p>Cornaceae</p>	<p>Par la multiplication végétative les cornouillers soyeux peuvent localement couvrir des grandes surfaces et concurrencer voir chasser la flore indigène.</p>
	<p>Cotoneaster de Simons</p>	<p><i>Cotoneaster simonsii</i></p>	<p>Rosaceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée</p>
	<p>Cotoneaster rampant</p> 	<p><i>Cotoneaster horizontalis</i></p>	<p>Rosaceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée</p>
	<p>Cotula à feuilles de coronopus, cotule pied-de-corbeau</p>	<p><i>Cotula coronopifolia</i></p>	<p>Asteraceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. Zone humide : sol humide à trempé.</p>
	<p>Crassule de Heims</p> 	<p><i>Crassula helmsii</i></p>	<p>Crassulaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante avérée commercialisée (aquatique)</p>









Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Cuscute volubile	<i>Cuscuta australis</i>	Cuscutaceae	Espèce exotique envahissante avérée introduite. Usages médicaux.
	Datura stramoine 	<i>Datura stramonium</i>	Solanaceae	Espèce à surveiller Commercialisée. ☠ très toxique.
	Dent de lion du Cap, Souci du Cap	<i>Arctotheca calendula</i>	Asteraceae	Espèce à surveiller Commercialisée
	Digitaire faux-paspale 	<i>Paspalum distichum</i>	Poaceae	Espèce exotique envahissante avérée introduite. Zone humide
	Elodée de Nuttall, Elodée à feuilles étroites 	<i>Elodea nuttallii</i>	Hydrocharitaceae	Espèce exotique envahissante avérée commercialisée (aquatique). Bio-remédiation.









Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	<p>Elodée dense, Elodée d'Argentine ou du Brésil</p> 	<p><i>Egeria densa</i></p>	<p>Hydrocharitaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante avérée commercialisée (aquatique)</p>
	<p>Epilobe à fruits courts, Epilobe d'automne</p>	<p><i>Epilobium brachycarpum</i></p>	<p>Onagraceae</p>	<p>Espèce à surveiller introduite</p>
	<p>Epilobe ciliée</p> 	<p><i>Epilobium adenocaulon</i></p>	<p>Onagraceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. Zone humide.</p>
	<p>Epinard de la Nouvelle-Zélande</p>	<p><i>Tetragonia tetragonioides</i></p>	<p>Aizoaceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée. Comestible.</p>
	<p>Erable négundo</p> 	<p><i>Acer negundo</i></p>	<p>Aceraceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée</p>
	<p>Erable sycomore</p> 	<p><i>Acer pseudo-platanus</i></p>	<p>Aceraceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle commercialisée</p>









Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Eragrostide pectinée	<i>Eragrostis pectinacea</i>	Poaceae	Espèce exotique envahissante avérée introduite
	Euphorbe tachetée, euphorbe maculée.	<i>Euphorbia maculata</i>	Euphorbiaceae	Espèce à surveiller introduite. ☠
	Faux arum jaune, Lysichite américain	<i>Lysichiton americanus</i>	Araceae	Considérée comme envahissante, son apparition en Europe semble être due à des plantations sauvages et illégales, dans les zones humides. Résistante, elle se répand très bien au point de menacer la végétation d'origine. cette espèce impressionnante par sa taille forme rapidement de grands peuplements et recouvre ainsi de vastes surfaces au détriment de la flore naturelle.
	Faux kikuyu, Herbe des Bermudes, Chiendent de Bœuf	<i>Stenotaphrum secundatum</i>	Poaceae	Espèces exotique envahissante potentielle commercialisée. Zone humide
	Ficoïde douce, griffe de sorcière, croc de sorcière ou figuier des Hottentots	<i>Carpobrotus acinaciformis</i> <i>Carpobrotus edulis</i>	Aizoaceae	Espèce exotique envahissante potentielle commercialisée. Comestible : Le fruit peut être consommé cru, ou cuit en confiture ou jus de fruit au goût acide..













Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Figuiers d'Inde 	<i>Opuntia humifusa</i>	Cactaceae	Climat chaud. Considéré comme envahissante dans beaucoup de pays dans le monde. Fruits comestibles.
	Frêne rouge 	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Oleaceae	Espèce à surveiller Commercialisée
	Griottier 	<i>Prunus cerasus</i>	Rosaceae	Espèce à surveiller Commercialisée. Fruits comestibles. 
	Héliotrope d'hiver, Pétafite odorant, Pétafite des Pyrénées	<i>Petasites fragrans</i>	Aceraceae	Espèces exotique envahissante potentielle commercialisée. Zone humide.
	Herbe de la Pampa	<i>Cortaderia selloana</i>	Poaceae	Espèce exotique envahissante avérée commercialisée












Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Hydrocotyle fausse renoncule 	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i> <i>Hydrocotyle verticillata</i>	Araliaceae	Espèce exotique envahissante avérée commercialisée (aquatique)
	Jacinthe d'eau 	<i>Eichhornia crassipes</i>	Pontederiaceae	Espèce à surveiller Commercialisée (aquatique). Climat chaud. Phyto-épuration. Bio-remédiation. Elle peut nourrir les canards.
	Jussie d'Uruguay, Jussie à grandes fleurs	<i>Ludwigia uruguayensis</i> <i>Ludwigia grandiflora</i>	Onagraceae	Espèce exotique envahissante avérée commercialisée Interdites à la vente depuis mai 2007 (aquatique)
	Jussie rampante	<i>Ludwigia peploides</i>	Onagraceae	Espèce exotique envahissante avérée commercialisée Interdites à la vente depuis mai 2007 (aquatique)
	Lagarosiphon, élodée crépue 	<i>Lagarosiphon major</i>	Hydrocharitaceae	Espèce à surveiller Commercialisée (aquatique)











Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Laitue d'eau, Salade du Nil 	<i>Pistia stratiotes</i>	Araceae	Espèce à surveiller Commercialisée (aquatique). Usages médicaux. Bio-remédiation : La <i>Pistia</i> est un hyperaccumulateur de cadmium, de cuivre et de mercure . 
	Laurier palme, laurier-cerise, laurier de Trébizonde, laurier-amande	<i>Prunus laurocerasus</i>	Rosaceae	Espèces exotique envahissante potentielle commercialisée. ⚠️
	Laurier sauce, Laurier noble, Laurier vrai 	<i>Laurus nobilis</i>	Rosaceae	Espèces exotique envahissante potentielle commercialisée. Aromate.
	Lentille d'eau à turions	<i>Lemna turionifera</i>	Lemnaceae	Espèce à surveiller introduite (aquatique). Complément alimentaire pour cochons et carpes herbivore. Bio-épuration : biorestauration des eaux polluées .
	Lentille d'eau minuscule	<i>Lemna minuta</i>	Lemnaceae	Espèce exotique envahissante avérée introduite (aquatique). Complément alimentaire pour cochons et carpes herbivore. Bio-épuration : biorestauration des eaux polluées .











Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	 Lindernie douteuse ou lindernie fausse-gratiolle	<i>Lindernia dubia</i>	Linderniaceae	Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. Zone humide.
	lupin à feuilles nombreuses, lupin des jardins ou lupin à folioles nombreuses	<i>Lupinus polyphyllus</i>	Fabaceae	Cette grande plante forme des peuplements denses qui peuvent rapidement se développer, évincer presque toutes les autres espèces, en Europe, et dégrader les prairies sèches riches en espèces. L'espèce est considérée comme invasive dans divers pays d'Europe du Nord et en Nouvelle Zélande, mais il s'agit généralement de formes hybrides de type Lupin de Russell ou bien de <i>Lupinus x pseudopolyphyllus</i> (<i>Lupinus polyphyllus</i> × Lupinus nootkatensis) échappées des champs et des jardins.
	Lyciet commun, lyciet de Barbarie (Goji) 	<i>Lycium barbarum</i>	Solanaceae	Espèce à surveiller Commercialisée. Fruits séchés comestibles. ☠️. Usages médicaux.
	Mahonia à feuilles de houx	<i>Mahonia aquifolium</i>	Berberidaceae	Espèce à surveiller Commercialisée. Fruits comestibles après cuisson mais amères.
	Marronnier commun, marronnier d'Inde  ou marronnier blanc	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Hippocastanaceae	Espèce à surveiller Commercialisée. ☠️. Usages médicaux.








Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Matricaire discoïde, matricaire odorante, matricaire en disque.	<i>Matricaria discoidea</i>	Asteraceae	Espèce à surveiller introduite
	Mimosa d'hiver ou mimosa blanchâtre	<i>Acacia dealbata</i>	Mimosaceae	Espèce exotique envahissante potentielle commercialisée
	Miscanthus de Chine, Roseau de Chine 	<i>Miscanthus sinensis</i>	Poaceae	Espèce à surveiller Commercialisée
	Montbretia	<i>Crocsmia x crocosmiiflora</i>	Iridaceae	Espèces exotique envahissante potentielle commercialisée
	Morelle de la Caroline  	<i>Solanum carolinense</i>	Solanaceae	Climat chaud. Plante épineuse. La morelle de la Caroline est considérée comme une mauvaise herbe nuisible dans plusieurs États américains. Toutes les parties de la plante sont toxiques à des degrés divers, en raison de la présence de solanine qui est un alcaloïde toxique et l'une des défenses naturelles de la plante. L'ingestion de fruits peut causer des douleurs abdominales, la dépression circuloire et respiratoire ou même la mort. ☠️.














Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	 <p>morelle jaune</p>	 <p><i>Solanum elaeagnifolium</i></p>	<p>Solanaceae</p>	<p>Climat chaud.</p>
	<p>Morelle velue, morelle poilue</p>	<p><i>Solanum villosum</i></p>	<p>Solanaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle d'introduction accidentelle. Les fruits contiennent un alcaloïde, la solanine, ce qui les rendent très toxiques ☠️. Climat chaud.</p>
	<p>Muguet des pampas</p> 	<p><i>Salpichroa origanifolia</i></p>	<p>Solanaceae</p>	<p>Espèce à surveiller introduite. La baie blanc-crème, d'un diamètre de 10 à 15 mm, est comestible.</p>
	<p>Myriophylle du Brésil</p> 	<p><i>Myriophyllum aquaticum</i></p>	<p>Haloragaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante avérée commercialisée (aquatique). La commercialisation de cette plante est interdite au Royaume-Uni, depuis avril 2014.</p>
	<p>Paulownia</p> 	<p><i>Paulownia tomentosa</i></p> 	<p>Scrophulariaceae</p> 	<p>Cultivé pour la production de bois, cet arbre ornemental, aux racines à la pousse rapide et aux nombreux rejets, a tendance à s'échapper et à envahir agressivement les zones perturbées, y compris les habitats de plantes rares, formant des peuplements mono-spécifiques. Il se révèle être une plante envahissante dans l'est de Etats-Unis et au Japon. C'est une plante pionnière. Son large système racinaire empêche l'érosion des sols.</p>















Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	<p>Ptérocaryer du Caucase, noyer du Caucase</p> 	<p><i>Pterocarya fraxinifolia</i></p> 	<p>Juglandaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle commercialisée. Fruits comestibles.</p>
	<p>Puéraire hérissée, Kudzu</p> 	<p><i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i></p>	<p>Fabaceae</p>	<p>Climat chaud. Grace à une croissance extrêmement rapide (pouvant atteindre 26 cm par jour, soit 20 m par année) et à ces longues tiges, cette espèce peut rapidement recouvrir d'importantes surfaces, étouffer des arbres entiers et déplacer la flore indigène ou causer des dommages à des infrastructures. Il met en danger la survie d'espèces très rares (par exemple, <i>Cistus salvifolius</i>). Ses tiges sont faiblement urticantes, ses semences éventuellement toxiques. Le kudzu infeste de 20 à 30000 km² de territoire aux États-Unis et entraîne environ 500 millions de dollars/an tant pour les terres agricoles perdues que pour son éradication. Futur envahisseur en Europe.</p>
	<p>Olivier de Bohême, Chalef</p> 	<p><i>Elaeagnus angustifolia</i></p>	<p>Elaeagnaceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée</p>
	<p>Onagre à grandes fleurs, onagre à sépales rouges, onagre de Lamarck</p> 	<p><i>Oenothera erythrosepala</i> <i>Oenothera glazioviana</i></p>	<p>Onagraceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée. Comestible : racine, feuille, graine.</p> 
	<p>Onagre bisannuelle, Herbe-aux-ânes</p>	<p><i>Oenothera biennis</i></p>	<p>Onagraceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée. Comestible : racine, feuille. Huile comestique.</p>











Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Orpin bâtard 	<i>Sedum spurium</i>	<u>Crassulaceae</u>	L'orpin bâtard peut former des peuplements denses dans des prairies et des gazons secs et concurrencer la flore indigène. L'orpin stolonifère a probablement souvent été identifié comme étant l'orpin bâtard, mais il a récemment été formellement identifié dans une région où il crée des dommages dans des prairies et pâturages. L'orpin stolonifère et l'orpin bâtard mettent en danger les prairies maigres. Ils peuvent s'y étendre très rapidement, recouvrir de grosses surfaces et en évincer des espèces indigènes souvent peu fréquentes à menacées.
	Orpin stolonifère 	<i>Sedum stoloniferum</i>	<u>Crassulaceae</u>	Sur son caractère envahissant voir l'orpin bâtard. Selon <i>hortipedia</i> , la plante est toxique. Source : http://fr.hortipedia.com/wiki/Sedum_stoloniferum
	Oseille à oreillettes 	<i>Rumex thyrsiflorus</i>	<u>Polygonaceae</u>	Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement
	Palmier de Chine, palmier à chanvre  Ou palmier chanvre.	<i>Trachycarpus fortunei</i>	<u>Arecaceae</u>	Espèce à surveiller introduite. Comestible : les inflorescences sont consommées comme légumes. Les fruits sont également comestibles à maturité, bien que peu recherchés.
	Panic à inflorescence dichotome 	<i>Panicum dichotomiflorum</i>	<u>Poaceae</u>	Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement









Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Paspale dilaté 	<i>Paspalum dilatatum</i>	Poaceae	Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. Plante fourragère cultivée en Amérique du Nord et Australie.
	Périploque grecque 	<i>Periploca graeca</i>	Asclepiadaceae	Espèce à surveiller Commercialisée. ☠️ (liane).
	Phytolaque d'Amérique, Raisin d'Amérique	<i>Phytolacca americana</i>	Phytolaccaceae	Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. ☠️
	Pois vivace, gesse à larges feuilles	<i>Lathyrus latifolius</i>	Fabaceae	Espèce à surveiller Commercialisée.
	Pourpier d'été, pourpier maraîcher ou porcelane 	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae	Il est souvent considéré comme un adventice , bien qu'il soit cultivé pour l'alimentation et utilisé en phytothérapie . Usages médicaux. Il est connu comme une mauvaise herbe bénéfique dans des endroits où il ne pousse pas déjà comme une plante cultivée. Climat chaud. Comestible : feuilles.
	Queue de lézard, Saurure penchée 	<i>Saururus cernuus</i>	Saururaceae	Espèce à surveiller Commercialisée. Zone humide, bassin aquatique.















Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	 Renouée à nombreux épis	<i>Polygonum polystachyum</i> (<i>Aconogonum polystachyum</i>)	Polygonaceae	Espèce à surveiller Commercialisée
	Renouée du Japon, Renouée asiatique ou grande Renouée	<i>Reynoutria japonica/x Bohemica</i>	Polygonaceae	Espèce exotique envahissante avérée commercialisée. (Comestible : jeunes pousses consommées crues ou cuites). Usages médicinaux.
	Rhododendron des parcs	<i>Rhododendron ponticum</i>	Ericaceae	Espèce à surveiller Commercialisée
	Robinier faux-acacia, Acacia 	<i>Robinia pseudo-acacia</i>	Fabaceae	Espèce exotique envahissante avérée commercialisée
	Ronce d'Arménie	<i>Rubus armeniacus</i>	Rosaceae	Espèces exotique envahissante potentielle commercialisée. Fruits comestibles. Sa classification scientifique fait l'objet de nombreuses confusion avec d'autres espèces similaires : <i>Rubus praecox</i> et <i>Rubus ulmifolius</i> .










Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	<p>Rosier du Japon, Rosier rugueux</p> 	<p><i>Rosa rugosa</i></p>	<p>Rosaceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée</p>
	<p>Rudbéckie laciniée</p> 	<p><i>Rudbeckia laciniata</i></p>	<p>Asteraceae</p>	<p>Elle forme des peuplements mono-spécifiques denses. Il a été rapporté des cas d'empoisonnement de chevaux, de moutons et de porcs. Zone humide.</p>
	<p>Sagittaire à larges feuilles, Flèche du Japon, Patate d'eau.</p> 	<p><i>Sagittaria latifolia</i></p>	<p>Alismataceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle commercialisée. Zone humide, bassin aquatique. Tubercules comestible.</p> 
 	<p>Sainfoin d'Espagne, lavanèse, alfalfa galéga, galéga officinal, rue de chèvre</p> 	<p><i>Galega officinalis</i></p>	<p>Fabaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. ☠. Usages médicaux.</p>
	<p>Sénéçon de Jacob ou sénéçon jacobée</p> 	<p><i>Jacobaea vulgaris</i></p> 	<p>Aceraceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. ☠. Elle peut être très envahissante dans certaines régions (comme en Bretagne). Toxicité : Ce sénéçon est toxique (voire mortel) pour les équins et bovins, mais consommable en petites quantités par les ovins (chez lesquels il pourrait avoir un effet vermifuge). Sa toxicité est liée à ce qu'il contient une dizaine d'alcaloïdes pyrrolizidiniques (sénécionine, jacobine ...), toxiques pour le foie de certaines espèces.</p>


Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Seneçon du Cap  Ou seneçon de Mazamet	<i>Senecio inaequidens</i> 	Aceraceae	Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. ☠.
	Seneçon en arbre 	<i>Baccharis halimifolia</i>	Aceraceae	Espèce exotique envahissante avérée commercialisée
	Sétaire 	<i>Setaria faberi</i>	Poaceae	Espèce à surveiller introduite
	Sycos anguleux 	<i>Sycos angulatus</i> 	Cucurbitaceae	La plante forme des tapis au sol ou couvre les arbres, à l'aide de vrilles. Partiellement invasive en Europe du Sud et considérée comme invasive dans son aire d'origine. <i>S. angulatus</i> est typiquement une mauvaise herbe des maïs, des sojas et des sorghos. 
	Solidago à feuilles de graminée 	<i>Solidago graminifolia</i> 	Aceraceae	Des propriétés chimiques allélopathiques ont été trouvées dans extraits de racines et de feuilles de <i>E. Graminifolia</i> et peut interférer avec la croissance des autres espèces. Elle peut éliminer d'autres espèces végétales et réduire la biodiversité.

Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	<p>Solidage du Canada, verge d'or du Canada.</p> 	<p><i>Solidago canadensis</i></p>	<p>Aceraceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée</p>
	<p>Solidage glabre, Grande verge-d'or, Gerbe d'or</p> 	<p><i>Solidago gigantea</i></p>	<p>Aceraceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée</p>
	<p>Sorgho d'Alep, Houlique d'Alep</p> 	<p><i>Sorghum halepense</i></p>	<p>Poaceae</p>	<p>Espèce à surveiller introduite</p>
	<p>Souchet doré, souchet comestible, souchet sultan, amande de terre.</p> 	<p><i>Cyperus esculentus</i></p>	<p>Cyperaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. Tubercules comestibles. Zone humide.</p>
	<p>Souchet robuste, souchet vigoureux, galanga comestible et galanga pâle.</p> 	<p><i>Cyperus eragrostis</i></p>	<p>Cyperaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. Tubercules comestibles. Zone humide. Elle pourrait servir pour fabriquer du biocarburant.</p>

Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	<p>Spartine de Townsend, Spartine anglaise</p> 	<p><i>Spartina x townsendii</i></p>	<p>Poaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante avérée introduite. C'est une plante halophyte, hybride naturel fertile de <i>Spartina maritima</i> et <i>Spartina alterniflora</i>.</p>
	<p>Sporobole tenace, herbe charbon.</p> 	<p><i>Sporobolus indicus</i></p>	<p>Poaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement. Les feuilles de l'inflorescence et supérieures sont parfois recouvertes du noir de charbon d'un champignon du genre <i>Bipolaris</i>.</p>
	<p>Stipa, cheveux d'ange</p> 	<p><i>Nassella tenuissima</i></p>	<p>Poaceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée</p>
	<p>Sumac de Virginie, sumac vinaigrier, sumac amarante</p> 	<p><i>Rhus typhina</i></p>	<p>Anacardiaceae</p>	<p>Espèce à surveiller Commercialisée. ☠️. (Fruit comestible).</p>

Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	<p>Sumac vénéneux, sumac grimpant, herbe à puce, bois de chien.</p> 	<p><i>Toxicodendron radicans</i></p> 	<p>Anacardiaceae</p>	<p>Elle est répertoriée comme une mauvaise herbe nuisible aux Etats-Unis et au Canada. Il y a un risque qu'elle devienne envahissante en Europe. Il peut pousser dans des zones soumises à de saison des inondations ou saumâtre de l'eau. Zone humide.</p> 
	<p>Symphorine blanche</p> 	<p><i>Symphoricarpos albus</i></p> 	<p>Caprifoliaceae</p>	<p>Espèce exotique envahissante potentielle commercialisée. ☠. Ses baies blanches sont toxiques.</p>
	<p>Topinambour, Hélianthe tubéreuse</p> 	<p><i>Helianthus tuberosus</i></p> 	<p>Asteraceae</p> 	<p>Comme plante ornementale elle a tendance à s'échapper des jardins, de former des populations denses surtout le long des cours d'eau. Les parties aériennes disparaissant pendant l'hiver, l'espèce laisse des rives nues exposées à l'érosion. Des populations dominantes ne se forment que lorsque les besoins élevés en lumière, eau et nutriments sont satisfaits. Pendant la période de végétation, le feuillage dense des topinambours recouvre rapidement le sol, concurrence la végétation indigène et crée des formations pauvres en espèces. Ce danger d'érosion est accru du fait que les tubercules sont déterrés par les animaux. Zone humide. Tubercules comestibles.</p>
	<p>Vergerette annuelle</p> 	<p><i>Erigeron annuus</i></p> 	<p>Asteraceae</p>	<p>Espèce à surveiller introduite</p>

Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Vergerette de Bueno-Aires 	<i>Conyza bonariensis</i>	Asteraceae	Espèce à surveiller introduite
	Vergerette de Sumatra, Erigéron de Guernesey 	<i>Conyza sumatrensis</i>	Asteraceae	Espèce exotique envahissante potentielle introduite accidentellement
	Vergerette du Canada, Erigéron du Canada 	<i>Conyza canadensis</i>	Asteraceae	Espèce à surveiller introduite
	Verveine de Buenos Aires 	<i>Verbena bonariensis</i> L.	Verbenaceae	Espèce à surveiller Commercialisée
	Vigne-vierge vraie, vigne vierge à cinq folioles ou vigne vierge de Virginie	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Vitaceae	Espèce à surveiller Commercialisée. Dans certains pays, comme en Suisse, elle est parfois considérée comme une plante invasive interdite de culture.

Images	Nom commun ou vernaculaire	Nom scientifique	Famille	Statut (en Vendée) / Commentaires
	Vigne vierge commune.	<i>Parthenocissus inserta</i>	Vitaceae	Espèce à surveiller Commercialisée. L'espèce peut parfois former des peuplements denses dans des forêts alluviales perturbées. Le feuillage dense rend difficile la croissance d'autres plantes.

Raisons de ce document :

En France, il n'existe pas d'Observatoire centralisé des plantes invasives présentes en France (qui serait financé par les agriculteurs, les syndicats agricoles, soutenus par l'INRA¹, l'IRSTEA², etc. les laboratoires universitaires botaniques etc. ...). Il n'y a pas, non plus de base de données centralisée, donnant un inventaire complet et exhaustif de toutes ces plantes, sur le modèle par exemple, des bases anglo-saxonnes : a) HEAR³, b) ISSG⁴, c) CABI⁵, d) National Invasive Species Information Center (USA)⁶ etc. Il existe bien le site bioinvasiv.fr, mais il n'a pas réalisé cet inventaire complet. Il y a plusieurs sites donnant des fiches descriptives de plantes invasives dans leurs régions respectives (Centre de ressources Loire nature⁷, Conservatoire Botanique National Méditerranéen⁸, Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire⁹, Conservatoire Botanique National de Brest¹⁰ etc. etc.), ainsi que le Centre national de données et d'informations sur la flore de Suisse¹¹, sans que ces sites ne se concertent vraiment ou travaillent la main dans la main.

Cette liste risque d'évoluer avec le changement climatique (et l'arrivée de plantes tropicales : jacinthe d'eau, physalis, passiflores, kudzu (*Pueraria montana*), figuier de Barbarie ou d'Inde (*Opuntia sp. ...*), *Agave sp. ...*).

Certaines plantes peuvent être envahissantes ou ayant un fort potentiel de mauvaise herbe _ comme a) l'ortie dioïque (*Urtica dioica*), mais il est vrai en milieu riche en azote, b) Épine noire ou Prunellier (*Prunus spinosa*), c) le pourpier d'été, pourpier maraîcher ou porcelane (*Portulaca oleracea*) etc. _, mais en général, elles ne sont pas répertoriées ou incluses dans la liste des plantes envahissantes. Peut-être parce qu'elles ont aussi un rôle utile et bénéfique : par exemple, elles peuvent être source d'engrais vert ou insecticide naturel, comme l'ortie, ou favorisant la biodiversité, comme le prunellier etc. ...

Source : Liste des plantes exotiques envahissantes, en Loire-Atlantique et Vendée. Mise à jour 2013. Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf, <http://www.baie-bourgneuf.com/wp-content/uploads/2011/10/Liste-plantes-invasives-MAJ-2013.pdf>

¹ Institut national de la recherche agronomique, <http://www.inra.fr>, <http://www7.inra.fr>

² Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, <http://www.irstea.fr/accueil>

³ A) Hawaiian Ecosystems at Risk project (HEAR), <http://www.hear.org> et b) Global Compendium of Weeds, <http://www.hear.org/gcw/>

⁴ Global Invasive Species Database, <http://www.issg.org>

⁵ Invasive Species Compendium - CABI, <http://www.cabi.org/isc>

⁶ National Invasive Species Information Center (USDA, United States Department of Agriculture, USA), <http://www.invasivespeciesinfo.gov>

⁷ <http://www.centrederessources-loirenature.com>

⁸ <http://www.cbnmed.fr>

⁹ <http://www.cen-centre.org>

¹⁰ <http://www.cbnbrest.fr/>

¹¹ Et son site "Info Flora", <http://www.infoflora.ch>

Liste, elle-même, adaptée de la source suivante : DORTEL F., LACROIX P., LE BAIL J., GESLIN J., MAGNANON S., VALLET J., 2013 - Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire. Liste 2012. Conseil régional Pays-de-la-Loire. Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 33 p., http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/invasives_pdl.pdf